

二次災害防止の見える化

概要

弊社ではKYT、リスクアセスメントなど様々な安全活動を行っている。
しかしそれでも人間が作業している以上、万が一、億が一にでも労働災害が起こる可能性がある。

防災の知識は教わっているが、応急手当などの正しい知識は誰も知らなかった。万が一の被害を広げない為、誤った対応による二次災害を防ぐことを目的に作成。


資料内容

- ・緊急時連絡網と最寄病院マップ
- ・応急手当マニュアル
- ・応急手当用具の在庫管理

緊急連絡網と最寄り病院マップ

事業所緊急連絡網

所長 080-1501-080-
副主任 080-4248-
4248



注

個人情報のため一部を黒塗りにさせていただいています。

最寄病院連絡網

市救急相談センター (24時間対応)
電話 04-

最寄クリニック
東宮赤十字
所在地
診療科目
電話

最寄総合病院
最寄病院
診療科目
電話

応急手当マニュアル



特徴

- ・業務上起こりやすい怪我に絞り見やすくした
- ・写真を入れることで簡単に理解できるようにした
- ・外国人の作業者も使えるよう、三か国語を記載

1 止血 ～血が出た時は～ 止血 Stop bleeding

〈手当のしかた〉

1. ガーゼ等で直接押さえて圧迫止血をします。心臓より高い位置に持ってくると止血しやすくなります。
When stopping bleeding, strongly press the wound with gauze. Raise it higher than heart. 用紗布等圧迫止血, 把伤口放到比心脏高的位置比较容易止血
2. 手のひらや足のうらのケガは、神経が傷ついている場合も考えられるので、医療機関を受診しましょう。
Wound on palm or sole might hurt nerves. it is recommended to go to a hospital. 手心和脚背受伤的时候, 可能会伤到神经所以需要去医院就诊
3. 感染を防ぐため傷口をぬらさないようにします。
Try not to wet wound in order to avoid infection 为了防止感染不要把伤口弄湿
4. 大体の出血は30分で止まります。
(血液には直接触れず、コンビニ袋・ゴム手袋などを使用)
Normally bleeding stops in 30 minutes. (Do not touch blood directly. Use plastic bags or plastic gloves.) 出血大体会是30分钟左右 (不要直接接触血液 用手套或者塑料袋)



